

K tématu šíření fibropapilomatózy srnčí zvěře

Fibropapilomatóza je aktuální virové onemocnění srnčí zvěře, které je v Kraji Vysočina už plošně rozšířené. Přenáší se z kusu na kus přímým kontaktem (např. při srnčí říjí, u krmelců při zimním přikrmování), zvláště v případech, kdy dochází k narušení povrchu kůže např. poraněním ale také pobodání hmyzem (např. klíšťata, komáři a muchničky). Protože postižené kusy zpravidla neuhynou, přirozenou migrací se nemoc šíří na dosud zdravé kusy a do jiných lokalit. Rychlost šíření významně souvisí se stavy srnčí zvěře. Jestliže jsou stavy příliš vysoké, případně je v honitbě v zimních měsících málo krmících zařízení, tak dochází k rychlejšímu šíření.

Na fibropapilomatózu neexistuje žádná léčba a u lovné zvěře nelze k prevenci využít vakcinaci, která se používá u hospodářských zvířat. Aby bylo možné šíření fibropapilomatózy alespoň zpomalit, je nutné pravidelně lovit postižené kusy jako hlavní zdroj viru, včetně využití možnosti lovu holé zvěře do 2 let věku bez omezení. Postižené kusy s početnými kožními nádory, které se podaří ulovit, je potřeba neškodně zlikvidovat (např. zakopáním nebo spálením). **Postižené kusy neponechávat v honitbě jako újed!**

Zvěřinu z postižených kusů přednostně zpracovat v místě lovu, v žádném případě není nožné fibropapilomy ořezávat a zvěřinu následně prodávat do zvěřinových závodů. V letních měsících je nutné se vyvarovat skladování deky s nádory v domácnosti na místech s velkou koncentrací hmyzu. **Deku z postižených kusů nevyhazovat na hnojiště!** Z obecné prevence lze doporučit činit veškerá opatření ke zvýšení přirozené odolnosti srnčí zvěře v honitbě jako je např. pravidelná kontrola parazitóz a celoroční aplikace minerálů a vitamínů v lizech.

